IBSRELA®
(tenapanor) tablets
50 mg

¿BUSCA ALGO DIFERENTE PARA TRATAR SU IBS-C?

IBSRELA es un medicamento de venta con receta que funciona de forma diferente para aliviar el estreñimiento, el dolor de estómago y la hinchazón abdominal en adultos con síndrome del intestino irritable con estreñimiento (irritable bowel syndrome with constipation, IBS-C).

Pregunte a su proveedor de atención médica si IBSRELA podría ser adecuado para usted.

¿Qué es IBSRELA?

IBSRELA (tenapanor) es un medicamento de venta con receta que se utiliza en adultos para tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (IBS-C). **Se desconoce si IBSRELA es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

- **No administre IBSRELA a niños menores de 6 años, ya que puede hacerles daño.**

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

IBSRELA® (tenapanor) tablets 50 mg

ENTENDIENDO EL IBS-C

¿Qué es el IBS-C?

El IBS-C es una afección frecuente en la que las personas experimentan estreñimiento junto con otros síntomas de dolor de estómago. **¿Le resulta familiar?**

Síntomas de estreñimiento:

- Deposiciones poco frecuentes (menos de 3 por semana)
- Heces duras o grumosas
- Esfuerzos para ir al baño
- Sensación de que los intestinos no se vacían completamente

Síntomas del dolor de estómago:

- Dolor
- Hinchazón abdominal
- Molestias

Escanee o haga clic aquí

Si tiene síntomas de IBS-C que le siguen molestando, utilice esta herramienta para prepararse para hablar con su proveedor de atención médica.

¿Cuáles son las causas del IBS-C?

Las causas del IBS-C **varían de una persona a otra** y pueden incluir:

Las deposiciones se mueven demasiado lentamente por el intestino, como si un carro estuviera por debajo del límite de velocidad.

Fugas intestinales, donde la capa protectora en sus intestinos actúa como una pantalla de ventana con agujeros en ella que permite que las plagas pasen.

Nervios sensibles, como los oídos de un perro, que son más sensibles al sonido que los nuestros. Sus nervios pueden captar cosas que los demás no sienten en absoluto.

Interacción intestino-cerebro, que es una vía bidireccional. El intestino y el cerebro hablan entre sí, así que cuando su intestino no está bien, tiene sentido que usted tampoco lo esté.

Debido a que las causas del IBS-C pueden ser diferentes para cada persona, no hay un enfoque único para todos los tratamientos.

Es posible que tenga que probar diferentes medicamentos para encontrar el que es adecuado para usted.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)

- No debe administrar IBSRELA a pacientes de 6 años a menores de 18 años, ya que puede hacerles daño. IBSRELA puede causar diarrea intensa y su hijo/a podría deshidratarse gravemente (pérdida de una gran cantidad de agua y sal del cuerpo).
- No tome IBSRELA si un médico le ha dicho que tiene un bloqueo intestinal (obstrucción intestinal).

Antes de tomar IBSRELA, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si IBSRELA dañará al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si IBSRELA pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si toma IBSRELA.

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

IBSRELA®
(tenapanor) tablets
50 mg

¿PODRÍA SER IBSRELA LA DIFERENCIA PARA USTED?

IBSRELA es un medicamento de venta con receta que funciona de forma diferente para aliviar los síntomas del IBS-C

IBSRELA proporciona un alivio rápido y duradero*

Una semana después del tratamiento, la mayoría de las personas que toman IBSRELA comienzan a experimentar alivio del/de la:



- Estreñimiento
- Hinchazón abdominal
- Dolor de estómago
- Molestias

Con el uso continuado de IBSRELA:

- Se produce una mejoría adicional del dolor de estómago durante los primeros 3 a 4 meses de tratamiento
- Las mejorías en los síntomas del IBS-C suelen mantenerse*
  - Es importante que siga tomando IBSRELA según las indicaciones de su proveedor de atención médica

*Mejoría observada hasta el final del ensayo de 26 semanas.

Efectos secundarios frecuentes de IBSRELA:

- La diarrea es el efecto secundario más frecuente experimentado por aquellas personas que toman IBSRELA. Si se presenta diarrea con IBSRELA, tiende a ser de leve a moderada y normalmente desaparece en el plazo de una semana
- Deje de tomar IBSRELA y llame a su proveedor de atención médica si experimenta diarrea intensa mientras toma IBSRELA
- Otros efectos secundarios frecuentes de IBSRELA pueden incluir hinchazón o sensación de estómago lleno o presión en el abdomen, gases y mareos
- Si experimenta efectos secundarios, hable con su proveedor de atención médica sobre las formas en que puede controlarlos

Historias reales de pacientes reales

†Los resultados y experiencias individuales pueden variar.

Escanee o haga clic aquí para escuchar cómo Regina encontró el alivio de los síntomas de IBS-C con IBSRELA†

IBSRELA proporciona alivio de los síntomas del IBS-C para que pueda volver a hacer lo que le gusta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Efectos secundarios

La diarrea es el efecto secundario más frecuente del IBSRELA y a veces puede ser intensa. Deje de tomar IBSRELA y llame a su médico si desarrolla una diarrea intensa.

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

IBSRELA®
(tenapanor) tablets
50 mg

¿CÓMO ES DIFERENTE IBSRELA?

IBSRELA funciona de una manera diferente a otros medicamentos para el IBS-C

IBSRELA alivia los síntomas del IBS-C:

Mantener agua en el intestino para ayudar a ablandar las heces y facilitar su tránsito, de modo que tenga deposiciones más regulares y bien formadas.

Restaura la función de la barrera intestinal* para reducir el dolor de estómago.

Reduce la actividad de los nervios sensitivos al dolor en el intestino,* para reducir el dolor de estómago.

* Esto se observó en estudios con animales y se desconoce la relevancia para los seres humanos.

Cómo tomar IBSRELA

IBSRELA es un comprimido de 50 mg que se toma dos veces al día:

Justo antes del desayuno

Justo antes de cenar

Cosas que debe tener en cuenta al tomar IBSRELA:

Si omite una dosis, sáltese la dosis omitida y tome la siguiente dosis a la hora habitual

No tome 2 dosis de IBSRELA al mismo tiempo

Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas sobre tomar IBSRELA

IBSRELA actúa exclusivamente en el intestino para ayudar a reducir, mejorar y aliviar los síntomas del IBS-C

¿Listo para algo diferente?

Pregunte a su proveedor de atención médica si IBSRELA podría ser el medicamento adecuado para usted.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)

Otros efectos secundarios frecuentes de IBSRELA incluyen hinchazón, o sensación de estar lleno o presión en el abdomen (distensión), gases (flatulencia) o mareos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IBSRELA. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Puede notificar los efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088. También puede notificar efectos secundarios a www.fda.gov/medwatch.

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

IBSRELA®
(tenapanor) tablets
50 mg

ARDELYX ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR

$0* Pague tan solo $0 por IBSRELA

Los pacientes elegibles con seguro comercial pagan tan solo $0* por cada receta de 30 días de IBSRELA. El descuento se aplicará automáticamente a los pacientes aptos en la mayoría de las farmacias.

*Divulgación del programa: El Programa de asistencia para el copago está disponible para los pacientes sólo para uso "según lo indicado en la etiqueta". Consulte los términos y condiciones adicionales para conocer más requisitos de elegibilidad.

¿Necesita ayuda para adquirir IBSRELA?

ardelyx ASSIST™

ArdelyxAssist está aquí para usted.

Llámenos al 844-427-7352, opción 1

si tiene alguna pregunta o necesita apoyo para acceder a o financiar IBSRELA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)

Antes de tomar IBSRELA, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si IBSRELA dañará al feto;
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si IBSRELA pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si toma IBSRELA.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

IBSRELA®
(tenapanor) tablets
50 mg

¿ES HORA DE PROBAR ALGO DIFERENTE PARA SU IBS-C?

Pregunte a su proveedor de atención médica si IBSRELA podría ser adecuado para usted

Escanee o haga clic aquí para obtener más información

¿Qué es IBSRELA?

IBSRELA (tenapanor) es un medicamento de venta con receta que se utiliza en adultos para tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (IBS-C). **Se desconoce si IBSRELA es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

- **No administre IBSRELA a niños menores de 6 años, ya que puede hacerles daño.**
- No debe administrar IBSRELA a pacientes de 6 años a menores de 18 años, ya que puede hacerles daño. IBSRELA puede causar diarrea intensa y su hijo/a podría deshidratarse gravemente (pérdida de una gran cantidad de agua y sal del cuerpo).
- No tome IBSRELA si un médico le ha dicho que tiene un bloqueo intestinal (obstrucción intestinal).

Consulte el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento en la Información completa sobre la receta.

ardelyx

© Ardelyx, Inc. 2024. Todos los derechos reservados. Ardelyx e IBSRELA son marcas comerciales registradas, y ArdelyxAssist es una marca comercial de Ardelyx, Inc. US-IBS-0519 12/24